

表 1-1 動物用トリアージリスト

(参考文献 1 より引用・改変)

		赤	オレンジ	黄	緑	青
		即時	緊急	準緊急	低緊急	非緊急
		即時	15分以内	60分以内	2時間以内	4時間以内
A 外観評価	一般状態	<ul style="list-style-type: none"> 低血糖グルコース ≤ 60 mg/dL 直腸温 高体温 (≥ 41°C) / 低体温 (≤ 36.7°C) 	<ul style="list-style-type: none"> 点状出血・紫斑 ケトーシスを伴う高血糖 重度の疼痛 重度の脱水 高体温 (40.5~40.9°C) すぐに横になる 	<ul style="list-style-type: none"> 頭頸部の屈曲 顔面浮腫 中程度の痛み 触るとなる 震える 食欲不振 中程度の脱水 重度のかゆみ 高体温 (~40.4°C) 子犬・子猫の食欲不振 	<ul style="list-style-type: none"> 局所炎症 軽度の痛みやかゆみ 直腸温 39.0~39.9°C 	<ul style="list-style-type: none"> 元気活動性あり
	外傷		<ul style="list-style-type: none"> 臓器の脱出 致死性の毒物注入 ヘビやハチなどによる咬傷 眼球突出 	<ul style="list-style-type: none"> 中程度毒物摂取 開放骨折 口腔内の異物刺傷 皮膚創傷 		
B 呼吸評価	呼吸	<ul style="list-style-type: none"> 重度の呼吸困難 チアノーゼ 開口呼吸 可視粘膜蒼白 	<ul style="list-style-type: none"> 中程度の呼吸困難 急性の喘鳴音 間欠的開口呼吸 	<ul style="list-style-type: none"> 軽度の呼吸困難 酸素は必要なし 局所的な異常肺音 		
C 循環評価	循環	<ul style="list-style-type: none"> ショック(表1-2) 大量出血 	<ul style="list-style-type: none"> 制御困難な出血 血栓塞栓症の症状(表1-3) 腹部波動感(腹水) 	<ul style="list-style-type: none"> 軽度の出血 持続する部分出血 		
D 神経評価	神経	<ul style="list-style-type: none"> 発作中 無反応 	<ul style="list-style-type: none"> 意識障害 異常行動(急性) 連続的に鳴く 群発発作 急性視力低下 	<ul style="list-style-type: none"> 急性中枢 / 末梢神経障害 後躯麻痺 頭部斜頸 失神(無意識) 	<ul style="list-style-type: none"> 単発発作 	
	消化器	<ul style="list-style-type: none"> 腹部膨満(急性発症) 	<ul style="list-style-type: none"> 毒物や異物の摂取またはその可能性により24時間以上持続する嘔吐・食欲不振 	<ul style="list-style-type: none"> 異物摂取の可能性 連続的な嘔吐 タール便 	<ul style="list-style-type: none"> しぶり 嘔吐 	
	産科	<ul style="list-style-type: none"> 胎子がみえている 	<ul style="list-style-type: none"> 強い陣痛 	<ul style="list-style-type: none"> 妊娠中の陰部からの出血 		
	泌尿器		<ul style="list-style-type: none"> 尿道閉塞 痛みを伴う急激な精巢の腫脹 	<ul style="list-style-type: none"> 排尿困難のない赤色尿 		