

『犬と猫の治療薬ガイド 2023』（第1版第2刷）

訂正とお詫び

掲載記事中、以下の記述に誤りがございました。ここに訂正させていただくとともに読者の皆様および関係者の方々に深くお詫び申し上げます。

株式会社 EDUWARD Press

2026年3月12日作成

頁	記事タイトル	該当箇所	誤	正
p.48	抗菌薬 ホスホマイシン系薬 ホスホマイシン Fosfomycin (FOM)	<b>用量・用法</b> 10~40 mg/kg, 経口, 静注, 1日2~3回 [犬/猫]	10~40 mg/kg, 経口, 静注, 1日2~3回 [犬/猫]	10~40 mg/kg, 経口, 静注, 1日2~3回 <b>[犬]</b>
p.110	抗ウイルス薬 ネコインターフェロン（組換え型） インターキャット「東レ」	<b>用量・用法</b> 2.5~5 MU/kg, 静注, 1日1回, 通常隔日投与を3回行う [犬] 1~2.5 MU/kg, 静注, 1日1回, 通常連日投与を3回行う [猫]	2.5~5 MU/kg, 静注, 1日1回, 通常隔日投与を3回行う [犬] 1~2.5 MU/kg, 静注, 1日1回, 通常連日投与を3回行う [猫]	<b>1~2.5 MU/kg, 静注, 1日1回, 通常連日投与を3回行う [犬]</b> <b>2.5~5 MU/kg, 静注, 1日1回, 通常隔日投与を3回行う [猫]</b>
p.149	抗寄生虫薬 イミダゾール系抗原虫薬 ジミナゼンジアセチレート Diminazene Diaceturate	<b>用量・用法</b> 2~2.5 mg/kg, 筋注, 1回2日（3~5回繰り返す） [犬]	2~2.5 mg/kg, 筋注, 1回2日（3~5回繰り返す） [犬]	2~2.5 mg/kg, 筋注, <b>効果をみながら3~5回繰り返す [犬]</b>
p.339	鎮痛薬 非ステロイド性抗炎症薬（サリチル酸系）	<b>用量・用法</b> 0.5~1mg/kg, 経口, 1日1回 [犬] 1 mg/kg, 経口, 3日1回, または5 mg/頭, 経口, 3日1回	0.5~1 mg/kg, 経口, 1日1回 [犬] 1 mg/kg, 経口, 3日1回, または5 mg/頭, 経口, 3日1回 [猫]	<b>&lt;鎮痛&gt;</b> <b>10 mg/kg, 経口, 1日2回 [犬]</b> <b>10 mg/kg, 経口, 2日1回 [猫]</b> <b>&lt;抗炎症&gt;</b>

	アスピリン・ ダイアルミニ ート Aspirin and Dialuminate	[猫]		20~25 mg/kg, 経口, 1 日2回 [犬] 10~20 mg/kg, 経口, 2 日1回[猫]
P. 741	胃腸機能調整 薬 消化酵素配合 薬 パンクレアチ ン Pancreatin	[容量・用法] 0.3~0.5 mg/kg, 経 口, 1日3回, 食後に 投与 [犬/猫]	0.3~0.5 mg/kg, 経口, 1日3回, 食 後に投与 [犬/ 猫]	9~12mg/kg, 経口, 1日2 ~3回 [犬] 15~20 mg/kg, 経口, 1 日2回 [猫]