

『犬と猫の治療薬ガイド 2023』（第1版1刷）

訂正とお詫び

掲載記事中、以下の記述に誤りがございました。ここに訂正させていただくとともに読者の皆様および関係者の方々に深くお詫び申し上げます。

株式会社 EDUWARD Press

2026年3月12日作成

頁	記事タイトル	該当箇所	誤	正
p. 24	抗菌薬 注射用第三世代セファロスポリン系薬 セフォタキシムナトリウム	用量・用法 20~30 mg/kg, 静注, 筋注, 皮下注, 持続定 量点滴, 1日3~4回 [犬/猫]	静注, 筋注, 皮下 注, 持続定量点滴	静注, 筋注, 皮下注,
p. 41	抗菌薬 注射用カルバペネム系薬 イミペネム・シラスタチン ナトリウム (1:1)	用量・用法 5~10 mg/kg, 点滴静 注 (30~60分かけて 緩徐に投与), 筋注, 皮下注, 1日3~6回 [犬/猫]	1日3~6回	1日3~4回
p. 48	抗菌薬 ホスホマイシン系薬 ホスホマイシン	用量・用法 40~80 mg/kg, 経口, 静注, 1日2~3回 【犬/猫】	用量・用法 40~ 80 mg/kg, 経口, 静注, 1日2~3回 【犬/猫】	用量・用法 10~40 mg/kg, 経口, 静注, 1日 2~3回【犬】
p. 110	抗ウイルス薬 ネコインターフェロン (組 換え型) インターキャット「東レ」	用量・用法 2.5~5 MU/kg, 静注, 1日1回, 通常隔日投 与を3回行う [犬] 1~2.5 MU/kg, 静注, 1日1回, 通常連日投 与を3回行う [猫]	2.5~5 MU/kg, 静 注, 1日1回, 通 常隔日投与を3回 行う [犬] 1~2.5 MU/kg, 静 注, 1日1回, 通常 連日投与を3回行 う [猫]	1~2.5 MU/kg, 静注, 1 日1回, 通常連日投与を 3回行う【犬】 2.5~5 MU/kg, 静注, 1 日1回, 通常隔日投与を 3回行う【猫】

p. 149	抗寄生虫薬 イミダゾール系抗原虫薬 ジミナゼンジ アセチユレート Diminazene Diaceturate	<u>用量・用法</u> 2~2.5 mg/kg, 筋注, 1回2日 (3~5回繰り返す) [犬]	2~2.5 mg/kg, 筋注, 1回2日 (3~5回繰り返す) [犬]	2~2.5 mg/kg, 筋注, 効果をみながら3~5回繰り返す [犬]
p. 339	鎮痛薬 非ステロイド性抗炎症薬 (サリチル酸系) アスピリン・ダイアルミネート	<u>用量・用法</u> 0.5~1mg/kg, 経口, 1日1回 [犬] 1 mg/kg, 経口, 3日1回, または5 mg/頭, 経口, 3日1回 [猫]	0.5~1 mg/kg, 経口, 1日1回 [犬] 1 mg/kg, 経口, 3日1回, または5 mg/頭, 経口, 3日1回 [猫]	<鎮痛> 10 mg/kg, 経口, 1日2回 [犬] 10 mg/kg, 経口, 2日1回 [猫] <抗炎症> 20~25 mg/kg, 経口, 1日2回 [犬] 10~20 mg/kg, 経口, 2日1回 [猫]
p. 741	消化酵素配合薬 有胞子性乳酸菌・パンクレアチン Bacillus Coagulans・Pancreatin	[動物薬] バイオムバスター錠 「リケンベッツ」 <u>用量・用法</u> 経口, 1日2回【犬】 【20 kg以上】23錠	23錠	3錠
P. 741	胃腸機能調整薬 消化酵素配合薬 パンクレアチン Pancreatin	<u>用量・用法</u> 0.3~0.5 mg/kg, 経口, 1日3回, 食後に投与 [犬/猫]	0.3~0.5 mg/kg, 経口, 1日3回, 食後に投与 [犬/猫]	9~12mg/kg, 経口, 1日2~3回 [犬] 15~20 mg/kg, 経口, 1日2回 [猫]
p. 853~857	精神安定薬, 抗うつ薬	p. 853~857 掲載の以下の薬剤の分類	神経伝達物質トランスポート阻害	選択的セロトニン再取り込み阻害薬 (SSRI)

	神経伝達物質 トランスポー ター阻害薬 ・フルオキセ チン塩酸塩 ・フルボキサ ミンマレイン 酸塩	・フルオキセチン塩 酸塩 ・フルボキサミンマ レイン酸塩	薬 ・フルオキセチン 塩酸塩 ・フルボキサミン マレイン酸塩	・フルオキセチン塩酸塩 ・フルボキサミンマレイ ン酸塩
--	--	---------------------------------------	--	-----------------------------------