

『犬と猫のエマージェンシー対応』（第1版第1刷）

訂正とお詫び

掲載記事中、以下の記述に誤りがございました。ここに訂正させていただくとともに読者の皆様および関係者の方々に深くお詫び申し上げます。

株式会社 EDUWARD Press

2026年3月24日作成

頁	記事タイトル	該当箇所	誤	正
p. 17	コラム1	表 1-1 動物用トリ アージリスト 右から3列目・黄色 の列 下から5～1行目・循 環評価の行	表内 循環 ・軽度の出血 ・持続する部分出血 ・急性中枢/末梢神経障害 ・後躯麻痺 ・頭部斜頸 ・失神（無意識） 神経 ・異物摂取の可能性 ・連続的な嘔吐 ・タール便 消化器 ・妊娠中の陰部からの出血 産科 ・排尿困難のない赤色尿 泌尿器 空欄	正しい表は【別紙①】をご覧ください 循環 ・軽度の出血 ・持続する部分出血 神経 ・急性中枢/末梢神経障害 ・後躯麻痺 ・頭部斜頸 ・失神（無意識） 消化器 ・異物摂取の可能性 ・連続的な嘔吐 ・タール便 産科 ・妊娠中の陰部からの出血 泌尿器 ・排尿困難のない赤色尿
p. 10	もくじ	第11章尿管閉塞 下から3行目	Q69 胃瘻チューブ設置術の適応と注意 点は？・・・192	Q69 腎瘻 チューブ設置術の適応と注意 点は？・・・192
p. 76	Q28	表 6-1-5 の表タイト ル	表6-1-5 おもな抗てんかん発作薬とその 作用など	表6-1-5 おもな 降圧薬（浸透圧利尿薬） とその作用など
p. 288	さくいん	左段下から5行目、4 行目	胃瘻チューブ・・・186、192、194 — 設置術・・・192-193、196	腎瘻 チューブ・・・186、192、194 — 設置術・・・192-193、196

※別紙①

表 1-1 動物用トリアージリスト

(参考文献 1 より引用・改変)

		赤	オレンジ	黄	緑	青
		即時	緊急	準緊急	低緊急	非緊急
		即時	15分以内	60分以内	2時間以内	4時間以内
A 外観評価	一般状態	<ul style="list-style-type: none"> 低血糖グルコース ≤ 60 mg/dL 直腸温 高体温 (≥ 41℃) / 低体温 (≤ 36.7℃) 	<ul style="list-style-type: none"> 点状出血・紫斑 ケトーシスを伴う高血糖 重度の疼痛 重度の脱水 高体温 (40.5~40.9℃) すぐに横になる 	<ul style="list-style-type: none"> 頭頸部の屈曲 顔面浮腫 中程度の痛み 触るとなる 震える 食欲不振 中程度の脱水 重度のかゆみ 高体温 (~40.4℃) 子犬・子猫の食欲不振 	<ul style="list-style-type: none"> 局所炎症 軽度の痛みやかゆみ 直腸温 39.0~39.9℃ 	<ul style="list-style-type: none"> 元気活動性あり
	外傷		<ul style="list-style-type: none"> 臓器の脱出 致死性の毒物注入 ヘビやハチなどによる咬傷 眼球突出 	<ul style="list-style-type: none"> 中程度毒物摂取 開放骨折 口腔内の異物刺傷 皮膚創傷 		
B 呼吸評価	呼吸	<ul style="list-style-type: none"> 重度の呼吸困難 チアノーゼ 開口呼吸 可視粘膜蒼白 	<ul style="list-style-type: none"> 中程度の呼吸困難 急性の喘鳴音 間欠的開口呼吸 	<ul style="list-style-type: none"> 軽度の呼吸困難 酸素は必要なし 局所的な異常肺音 		
C 循環評価	循環	<ul style="list-style-type: none"> ショック(表1-2) 大量出血 	<ul style="list-style-type: none"> 制御困難な出血 血栓塞栓症の症状(表1-3) 腹部波動感(腹水) 	<ul style="list-style-type: none"> 軽度の出血 持続する部分出血 		
D 神経評価	神経	<ul style="list-style-type: none"> 発作中 無反応 	<ul style="list-style-type: none"> 意識障害 異常行動(急性) 連続的に鳴く 群発発作 急性視力低下 	<ul style="list-style-type: none"> 急性中枢 / 末梢神経障害 後躯麻痺 頭部斜頸 失神(無意識) 	<ul style="list-style-type: none"> 単発発作 	
	消化器	<ul style="list-style-type: none"> 腹部膨満(急性発症) 	<ul style="list-style-type: none"> 毒物や異物の摂取またはその可能性により24時間以上持続する嘔吐・食欲不振 	<ul style="list-style-type: none"> 異物摂取の可能性 連続的な嘔吐 タール便 	<ul style="list-style-type: none"> しぶり 嘔吐 	
	産科	<ul style="list-style-type: none"> 胎子がみえている 	<ul style="list-style-type: none"> 強い陣痛 	<ul style="list-style-type: none"> 妊娠中の陰部からの出血 		
	泌尿器		<ul style="list-style-type: none"> 尿道閉塞 痛みを伴う急激な精巢の腫脹 	<ul style="list-style-type: none"> 排尿困難のない赤色尿 		